Coelognatus erythrurus (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854)
(ex. *Elaphe eritrura*)



Nome scientifico:
Coaelognatus erytrurus (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854)

Sottospecie:
Coelognathus erythrurus celebensis (JAN 1863)
Coelognathus erythrurus erythrurus (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854)
Coelognathus erythrurus manillensis (JAN 1863)
Coelognathus erythrurus philippinus (GRIFFIN 1909)
Coelognathus erythrurus psephenoura (LEVITON 1979)

Sinonimi:
Plagiodon erythrurus DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL 1854
Herpetodryas erythrurus MÜLLER, DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL 1854
Coluber erythrurus BOULENGER 1894
Elaphe erythrura SMITH 1931
Coelognathus erythrurus HELFENBERGER 2001
Coelognathus erythrurus celebensis JAN 1863
Elaphe erythrura celebensis DE LANG & VOGEL 2005
Coelognathus erythrurus philippinus GRIFFIN 1909
Elaphe erythrura philippina GRIFFIN 1909
Coelognathus philippinus HELFENBERGER 2001

Nome comune:
Reddish rat snake

Dimensioni:
Da 90 a 120cm.

Area di distribuzione:
Indonesia (Buton e Sulawesi), Malaysia (Sabah, Borneo), Isole Filippine (Balabac, Bongao, Busvanga, Cebu, Culion, Jolo, Leyte, Luzon , Mindanao, Mindora, Negros, Palawan, Calamian Islands, Panay, Polillo, Samar).

Celebensis: Sulawesi
Manillensis: Luzon
Philippinus: Philippine Islands: Balabac, Bongao, Busuanga, Culion, Palawan, Sanga Sanga, Sibutu, Tawitawi.

Caratteristiche:
...

Note:
...

Allevamento:
...

Riproduzione:
...