

***Zamenis situla* (LINNAEUS, 1758)**  
**(ex. *Elaphe situla*)**



**foto di ROBERTO NISTRI**

**Nome scientifico:**

*Zamenis situla* (Linnaeus, 1758)

## Zamenis situla (LINNAEUS, 1758)

Ultimo aggiornamento Domenica 21 Novembre 2010 12:07

---

### Nome comune:

Leopard Snakes, European Ratsnake

### Sinonimi:

*Coluber Situla* LINNAEUS 1758

*Coluber leopardinus* BONAPARTE 1834

*Callopeltis leopardina* FITZINGER 1834

*Ablabes quadrilineatus* DUMÉRIL & BIBRON 1854 (fide WALLACH)

*Natrix leopardina* COPE 1862

*Coronella quadrilineata* JAN 1863

*Callopeltis quadrilineatus* SCHREIBER 1875

*Callopeltis quadrilineatus* BÖTTCHER 1877

*Coluber leopardinus* BOULENGER 1894

*Coluber leopardinus* BOULENGER 1913

*Elaphe situla* ENGELMANN et al 1993

*Elaphe situla* SCHULZ 1996

*Zamenis situla* UTIGER et al. 2002

*Elaphe situla* KUMLUTAS et al. 2004

*Zamenis situlus* SCHLÜTER 2006

*Zamenis situla* SPEYBROECK 2007

*Zamenis situla* VENCHI & SINDACO 2006

### Area di distribuzione:

Italia meridionale (a sud del fiume Ofanto), Jugoslavia occidentale: Croazia costiera (incluse alcune isole adriatiche), Erzegovina, Monte Negro, Macedonia, Turchia, Grecia (Cretae, Syros, Milos, Andros, Kynthos, Paros, Seriphos, Thira, Tinos, Kea, Lesbos, Syphnos, Chios, Corfu, Samos), Malta, Bulgaria (costa del Mar Nero, fiume Tundza), Albania, Polonia, Unione Sovietica, Ucraina (Krym).

Località assolate : muretti a secco, prati, radure, rovine e zone alluvionali.  
Dal livello del mare sino a 1600 mt. in Grecia e non oltre i 600 mt. in Italia.

### Dimensioni:

Da 70 a 90cm.

### Descrizione:

Testa abbastanza distinta dal corpo.

Di regola 27 file di squame dorsali, 8 (raramente 7 o 9) placche supralabiali, 1 placca preoculare, preorbitale inferiore assente.

Colorazione di fondo delle parti superiori, bruno-ocra o bruno-grigio, con sfumature rosa-turchese; sulla nuca è spesso presente una barra scura a forma di birillo, una barra scura unisce la commessura della bocca agli occhi e questi tra loro. La linea mediana del dorso è interessata da una serie di macchie vagamente circolari, di colore rosso cupo, orlate di nero, a volte modificate in due fasce longitudinali e parallele tra loro (varietà lineata).

**Note:**

Specie diurna ; agile e vivace, veloce e all'occorrenza abile nuotatrice. Caccia spesso al limite dell'ombra.

**Allevamento:**

Piccoli roditori come topi, arvicole e a volte lucertole. I giovani prediligono un'alimentazione a base di insetti e ortotteri.

**Riproduzione:**

Specie ovipara, accoppiamento preceduto da un lungo corteggiamento, deposizione di sole 3-5 uova, che schiudono in agosto-settembre.