

***Coelognathus helena* (DAUDIN, 1803)**  
**(ex. *Elaphe helena*)**



**Nome scientifico:**

*Coelognathus helena* (Daudin, 1803)

**Sottospecie:**

*Coelognathus helena helena* (DAUDIN 1803)

*Coelognathus helena monticollaris* (SCHULZ 1992)

**Nome comune:**

Trinket Snake

**Sinonimi:**

*Coluber helena* DAUDIN 1803  
*Herpetodryas helena* SCHLEGEL 1837  
*Cynophis bistrigatus* GRAY 1849  
*Plagiodon Helena* DUMÉRIL & BIBRON 1854  
*Herpetodryas malabaricus* JERDON 1854  
*Cynophis helena* GÜNTHER 1858  
*Cynophis helena* GÜNTHER 1859  
*Coluber helena* BOULENGER 1894  
*Coluber helena* WALL 1921  
*Elaphe helena* SMITH 1943  
*Elaphe helena* DAS 1996  
*Elaphe helena* SCHULZ 1996  
*Coelognathus helena* HELFENBERGER 2001  
*Coelognathus helena* UTIGER et al. 2002  
*Elaphe helena* AVADHANI 2005  
*Coelognathus helenus* JANZEN et al. 2007

*Coelognathus helena monticollaris* SCHULZ 1992  
*Coelognathus helena monticollaris* WHITAKER & CAPTAIN 2004

**Dimensioni:**

Mediamente i maschi da 90 a 100cm, le femmine da 120 a 130cm.

**Area di distribuzione:**

Sri Lanka, India (distretto di Pune, Maharashtra), Pakistan (Sind), Nepal, Bangladesh.

Sino a 900m SLM in Sri Lanka.

Durante la stagione calda passano molto tempo dentro a termitai, mentre nella stagione fredda sono più attive e passano molto tempo in cespugli e le fronde degli alberi.

**Dimensioni:**

...

**Descrizione:**

*Coelognathus helena* è marrone chiaro e marrone cioccolato con due striature nell'ultima parte del corpo, più chiara nella parte anteriore.

La testa è lunga e snella, gli occhi prominenti con pupille tonde. Due corte linee scure su entrambi i lati del collo, talvolta possono unirsi formando una sorta di "V" rovesciata.

Lateralmente è bianco perla.

Le squame sono lisce e lucide. Le squame anteriori all'occhio sono disseminate di pori, che possono essere sensoriali.

**Note:**

Indole normalmente tranquilla, ma non è raro vederle posti in posizione difensiva con il collo appiattito lateralmente e la bocca aperta. Talvolta vibra la coda come atteggiamento difensivo.

**Allevamento:**

Come i ratsnakes più noti, anche *C. helena* si alimenta di roditori che uccide per costrizione. Saltuariamente di volatili e loro uova.

I piccoli si alimentano anche con lucertole ed insetti.

**Riproduzione:**

Le femmine depongono da 6 a 8 lunghe uova.

I piccoli hanno lo stesso aspetto degli adulti.

Gli accoppiamenti sembrano avvenire durante tutto l'anno, ci sono casi documentati di deposizioni (Madras Snake Park) avvenute il 14 febbraio con schiusa l'11 aprile, altre deposizioni avvenute a metà dicembre ed altre a fine agosto.