

## ***Elaphe dione* (PALLAS, 1773)**



**Nome scientifico:**

*Elaphe dione* (Pallas, 1773)

**Nome comune:**

Steppes Ratsnakes

**Sinonimi:**

*Coluber Dione* PALLAS 1773

*Coluber diana* LATREILLE 1802

*Chironius dione* FITZINGER 1826

*Coluber eremita* EICHWALD 1831

*Coluber maeoticus* RATHKE 1837

*Coluber trabalis* SCHLEGEL 1837

*Coelopeltis dione* EICHWALD 1841

*Zamenis trabalis* DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL 1854

*Elaphis dione* DUMÉRIL & BIBRON 1854

*Elaphis dione* GÜNTHER 1864

*Coluber dione* BOULENGER 1894

*Zamenis trabalis* MÜLLER 1895

*Coluber dione* STONE 1899

*Elaphe dione* STEJNEGER 1907

*Zamenis pelliotti* MOCQUARD 1910

*Coluber dione* BOULENGER 1913

*Elaphe czerskii* NIKOLSKY 1914  
*Elaphe dione niger* GOLUBEVA 1923  
*Elaphe dione tenebrosa* SOBOLEVSKY 1929  
*Elaphe dione* ENGELMANN et al 1993  
*Elaphe dione* SCHULZ 1996  
*Elaphe dione* UTIGER et al. 2002

**Area di distribuzione:**

ucraina orientale, Russia meridionale e orientale, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Iran settentrionale, Armenia, Kirghizia, Korea, Mongolia, Russia, Cina settentrionale (a sud sino Sichuan nella parte occidentale e Jiangsu in quella orientale; Kiangsu, Shantung, Shansi, Shensi, Gansu; a nord sino al fiume Chang Jiang).

**Dimensioni:**

Lunghezza intorno ai 100 cm., può arrivare fino a 150 cm, nelle popolazioni dell'Asia centrale.

**Descrizione:**

Specie slanciata, con testa poco distinta dal corpo e occhio classico da colubrine con pupilla rotonda.

Scaglie corporali lisce, 23 (sovente 25) file di scaglie al centro del corpo, 8 placche sublabiali (a volte 7 o 9), 1 placca preoculare, 1 piccola placca suboculare al bordo anteriore dell'occhio. Colorazione di fondo grigio chiaro e bruno rossastro. Bande laterali leggermente marcate, 3 bande chiare e 4 bande più scure sul dorso ; macchie dorsali poco marcate possono essere disposte in modo trasversale.

Sulla testa è presente un ornamento a "V" o a "X". Sui lati della testa è presente una banda temporale scura che attraversa l'occhio.

Il ventre presenta una colorazione più chiara rispetto al dorso con delle puntature.

**Note:**

Si rinviene spesso nelle steppe e in foreste con poca vegetazione sottoboschiva, a volte in campi aridi e incolti. Può dimorare oltre i 2000 mt.

Specie diurna, terricola, spesso si rinviene sotto cumuli di pietre e macerie, in tronchi di albero e dentro tane di piccoli roditori.

Se minacciata, agita la coda con movimenti laterali molto veloci.

E' una specie che si adatta a tutte i tipi e di habitat e di condizioni climatiche.

Si nutre di piccoli mammiferi, lucertole, pesci, uccelli e loro uova.

**Allevamento:**

...

**Riproduzione:**

Per questa specie, dato il clima particolarmente freddo in cui vive, la natura ha fatto in modo che le uova schiudano dopo solo 2 o 3 settimane.